

内科学：肝疾患

39-050 肝硬変について正しいのはどれか。

1. 門脈圧が亢進する。
2. 血小板が増加する。~~減少する。~~
3. 胆汁分泌が増加する。~~減少する。~~
4. 血清γ-グロブリンが低下する。~~増加する。~~
5. 血中アンモニアが低下する。~~増加する。~~

41-053 肝硬変の症状で誤っているのはどれか。

1. 黄疸
2. 高アンモニア血症
3. 脾腫
4. 食道静脈瘤
5. 血小板増多 ~~減少~~

41-075 正しいのはどれか。 ~~経口感染~~

1. A型肝炎の主要感染経路は輸血である。
2. 慢性肝炎の半数以上はB型肝炎を原因とする。
3. ~~A~~C型肝炎は自然治癒する。~~C~~
4. 肝硬変の原因はアルコールが最も多い。~~C型肝炎から~~
5. 肝癌の半数以上は肝硬変から進展する。

~~* アルコール肝炎では脂肪肝が多い。~~

43-074 肝硬変の患者が茶碗1杯の吐血をした場合の原因として可能性が高いのはどれか。

1. 出血性胃炎
2. 吻合部潰瘍
3. 食道静脈瘤
4. アカラシア ~~食道下部の弛緩不全。嚥下障害、胸痛。~~
5. 逆流性食道炎 ~~食物の逆流、胸焼け、胸痛。~~

49-P-076 肝臓の機能不全によって起こる病態でないのはどれか。

1. 黄疸
2. 腹水
3. 出血傾向
4. 意識障害
5. 高コレステロール血症
~~低~~ ~~肝臓でのコレステロールの合成が阻害されるため。~~

50-A-095 肝硬変の患者が多量の吐血をした場合の原因として可能性が高いのはどれか。

1. 出血性胃炎
2. 吻合部潰瘍
3. 食道静脈瘤
4. アカラシア
5. 逆流性食道炎

門脈圧亢進症状

慢性肝炎や肝硬変では門脈圧が大進する。

- 食道静脈瘤
→ 破裂すると多量吐血
- 腹壁静脈怒張 (Xアウサの頭)
- 痔核
- 脾腫 → 血小板の減少

肝障害の症状

- 栄養素の代謝障害
- 高アンモニア血症 → 肝性昏睡
- 低アルブミン血症 → 浮腫、腹水
- γ-グロブリン↑
- 出血傾向、血液凝固障害
- 血小板減少
- 黄疸
- 女性化乳房 (男性)

型肝炎

- ・ A型 経口感染 (生のカキなど)
自然治癒。
- ・ B型 体液、血液感染
垂直感染 (出産時など)
劇症化しやすい。
- ・ C型 体液、血液感染
(体液感染は少ない)
慢性肝炎 → 肝硬変と
進行しやすい。