

精神医学：認知症

44-093 Alzheimer 型認知症と比べて Lewy 小体型認知症で特徴的な症状はどれか。

1. 失 認
2. 幻 視
3. 脱抑制
4. 反響言語
5. 感情失禁

45-P-097 認知症で記銘力低下と関連して出現する妄想はどれか。

1. 被毒妄想
2. 心気妄想
3. 罪業妄想
4. 憑きもの妄想
5. もの盗られ妄想

47-A-096 前頭側頭型認知症 (Pick 病) に特徴的な症状はどれか。2 つ選べ。

1. 幻 視
2. 考え無精
3. 替え玉妄想
4. 時刻表的行動
5. 物盗られ妄想

48-A-097 疾患と病変の組合せで正しいのはどれか。

1. Lewy 小体型認知症——白質の病変
2. Alzheimer 型認知症——大脳皮質の老人斑
3. 血管性認知症——黒質の神経細胞脱落
4. 大脳皮質基底核変性症——運動ニューロン病変
5. 前頭側頭型認知症——大脳皮質の腫大神経細胞

49-A-096 Lewy 小体型認知症に特徴的なのはどれか。

1. 幻視
2. 感情失禁
3. 滞続言語
4. 錐体路徴候
5. 時刻表的行動

49-A-098 Alzheimer 型認知症について正しいのはどれか。

1. 階段状に増悪する。
2. 女性より男性に多い。
3. 意味記憶の障害で発症することが多い。
4. 人物の見当識より時間の見当識が障害されやすい。
5. 軽度認知障害の 80%は Alzheimer 型認知症に移行する。

50-A-096 Alzheimer 型認知症と比較して Levy 小体型認知症に特徴的なのはどれか。

1. 常同行為
2. 取り繕い
3. 物盗られ妄想
4. 繰り返される幻視
5. 初期からの記憶障害

51-A-092 認知症をきたす疾患で脳外科的手術によって認知機能が改善する可能性があるのはどれか。2 つ選べ。

1. Lewy 小体型認知症
2. 進行性核上性麻痺
3. 慢性硬膜下血腫
4. Wernicke 脳症
5. 正常圧水頭症

51-A-096 病名と症状の組合せで正しいのはどれか。

1. 前頭側頭型認知症——脱抑制
2. 進行性核上性麻痺——取り繕い
3. 皮質基底核変性症——認知の変動
4. Lewy 小体型認知症——肢節運動失行
5. Alzheimer 型認知症——垂直性眼球運動障害

53-A-089 Lewy 小体型認知症に伴うことが多いのはどれか。

1. 幻視
2. 失語症
3. 高血圧
4. 聴覚障害
5. 入眠障害

53-A-097 器質性精神障害について正しいのはどれか。

1. 妄想はみられない。
2. 安定した人格を認める。
3. 記憶障害はみられない。
4. 抗精神病薬は投与しない。
5. 心理的要因の影響を受ける。

54-P-098 器質性精神障害の急性期の症状として最もみられるのはどれか。

1. 失語
2. せん妄
3. 知能低下
4. 性格変化
5. 健忘症候群

精神医学：統合失調症

44-096 統合失調症に特徴的な訴えはどれか。

- 2 つ選べ。
1. 「考えが伝わっている」
 2. 「考えが抜き取られる」
 3. 「考えがまとまらない」
 4. 「考えが先に進まない」
 5. 「考えがよどみなく浮かぶ」

44-097 統合失調症で障害されない精神機能はどれか。

1. 意 識
2. 知 覚
3. 感 情
4. 意 欲
5. 思 考

45-P-096 統合失調症で予後良好に関連する因子はどれか。

1. 陰性症状
2. 急性の発症
3. 早い発症年齢
4. 神経学的症状
5. 統合失調症の家族歴

46-P-097 治療中の統合失調症患者で眼球が上転し戻らない場合、最も可能性が高いのはどれか。

1. 転換症状
2. 悪性症候群
3. アカシジア
4. 急性ジストニア
5. 遅発性ジスキネジア

46-P-100 統合失調症の急性期治療で最も重要なのはどれか。

1. 薬物療法
2. 精神療法
3. 環境調節
4. 生活指導
5. 心理教育

47-A-097 統合失調症で現れにくいのはどれか。

1. 幻 声
2. 思考奪取
3. 被影響体験
4. 解体した会話
5. 夜間の意識変容

47-P-097 統合失調症の症状で、薬物療法によって比較的改善しやすいのはどれか。

1. 1日中何もしない。
2. 喜怒哀楽を表さない。
3. 自分の殻に閉じこもる。
4. 身だしなみを気にしない。
5. 他人の声が自分に呼びかけてくる。

48-A-096 統合失調症について正しいのはどれか。

1. 前駆期から幻聴がみられる。
2. 慢性期に軽度の認知機能障害がみられる。
3. 家族の感情表出が少ないほど再発率は高くなる。
4. 発症から治療開始までの期間は予後と関連がない。
5. 急性期の治療で症状が軽快した場合は速やかに薬物治療を中止する。

48-P-098 統合失調症の成因に関連がないのはどれか。

1. 遺伝素因
2. ドパミン仮説
3. アミロイド仮説
4. 神経発達障害仮説
5. 脆弱性 - ストレスモデル

49-A-097 統合失調症について正しいのはどれか。

1. 男性が女性より3倍多い。
2. 緊張型では昏迷がみられる。
3. 病前性格は循環気質が多い。
4. 死亡率は健常者と同じである。
5. 妄想型は破瓜型より発症年齢が低い。

49-P-096 統合失調症の予後について正しいのはどれか。

1. 男性の方が良い。
2. 若年発症の方が良い。
3. 陰性症状が優位な方が良い。
4. 緩徐に発症したものの方が良い。
5. 発症から治療開始までの期間が短い方が良い。

50-A-097 統合失調症で通院中の女性が壁を凝視したまま動かない。両上肢を拳上させるとそのままの姿勢を撮り続けた。考えられるのはどれか。

1. アカシジア
2. 悪性症候群
3. 急性ジストニア
4. 緊張病症候群
5. 薬剤性パーキンソニズム

51-A-097 統合失調症の前駆期にみられるのはどれか。

1. 聴覚過敏
2. 奇異な妄想
3. 滅裂な思考
4. 感情の平板化
5. 緊張病症候群

52-A-100 再発に高EE (Expressed Emotion) が深く関与している統合失調症患者の治療に有効なのはどれか。

1. 自律訓練法
2. 認知行動療法
3. 生活技能訓練
4. 家族心理教育
5. レクリエーション

54-P-096 統合失調症の患者が「不気味な何かが起こりそうだ」と不安緊迫感を訴えた。この症状はどれか。

1. 考想伝播
2. 作為体験
3. 妄想気分
4. 妄想知覚
5. 連合弛緩

精神医学：気分障害

44-098 うつ病に特徴的な症状はどれか。

2つ選べ。

1. 感情鈍麻
2. 激越症状
3. 早朝覚醒
4. 滞続言語
5. 滅裂思考

45-A-100 うつ病の治療で正しいのはどれか。

1. 重要な事項についての自己決定を促す。
2. 抗うつ薬は三環系薬物が最も広く用いられている。
3. 抗うつ薬の副作用を説明する。
4. 症状の改善後には抗うつ薬を速やかに中止する。
5. 電気痙攣療法は効果がない。

45-P-098 うつ病でみられる症状はどれか。

2つ選べ。

1. 自閉
2. 幻視
3. 妄想
4. 昏迷
5. 途絶

46-P-98 仮面うつ病で正しいのはどれか。

1. 作話症状が目立つ。
2. 仮性認知症を呈する。
3. 仮面様顔貌を呈する。
4. 身体症状が前景にでる。
5. 引きこもり傾向が強い。

47-A-098 うつ病でみられやすい訴えはどれか。

1. 「テレビカメラで見張られている」
2. 「何か恐ろしいことが起こりそうだ」
3. 「新しいアイデアが次々と湧いてくる」
4. 「自分の考えがみんなに知れ渡っている」
5. 「取り返しのつかない罪を犯してしまった」

48-P-096 気分（感情）障害の特徴について正しいのはどれか。2つ選べ。

1. うつ病は男性に多い。
2. うつ病の生涯有病率は約1%である。
3. 身体疾患を有する患者でうつ病の有病率が高い。
4. 双極性感情障害はうつ病より遺伝的素因の関与が強い。
5. 双極性感情障害はうつ病より平均初発年齢が高い。

49-P-100 うつ病への対応として適切なのはどれか。

1. 重要な事柄についての判断を促す。
2. 休養の重要性について説明する。
3. 自殺の可能性は話題にしない。
4. うつ病の診断は伝えない。
5. 気晴らしを推奨する。

50-A-098 双極性障害について正しいのはどれか。

1. 発症率は女性が2倍多い。
2. 気分安定薬が用いられる。
3. II型では重度の躁状態がみられる。
4. 単極性うつ病より遺伝性素因が少ない。
5. 同一個人では躁病相の回数はうつ病相の回数より多い。

51-P-096 双極性障害について正しいのはどれか。

1. 男性より女性が多い。
2. 単極性うつ病より自殺率が高い。
3. 単極性うつ病より有病率が高い。
4. 単極性うつ病より発症年齢が高い。
5. 単極性うつ病より遺伝素因の関与が低い。

52-A-096 双極性障害と比較した場合のうつ病の特徴はどれか。

1. 有病率が低い。
2. 平均初発年齢が低い。
3. 有病率の男女差が小さい。
4. 一卵性双生児の罹患一致率が低い。
5. 状況要因が誘因となって発症することが少ない。

53-P-100 うつ病の患者への対応として適切でないのはどれか。

1. 急性期には休息をとらせる。
2. 自殺しないように約束させる。
3. 重要な問題の決定を先延ばしさせる。
4. 抗うつ薬の副作用について説明する。
5. うつ病であることを伝えずに伏せておく。

54-A-096 うつ病に起こりやすい思考障害はどれか。

1. 迂遠
2. 観念奔逸
3. 思考制止
4. 思考途絶
5. 滅裂思考

54-P-080 認知行動療法で対象となるうつ病の自動思考のうち「極端な一般化」にあたるのはどれか。

1. そのときの感情に基づいて現実を判断する。
2. 全てに対して白黒をつけて割り切ろうとする。
3. 着目していることだけから短絡的に結論付ける。
4. 「こうするべきだ」と行動を制限して自分を責める。
5. 少数の事実から全てが同じ結果になると結論付ける。

54-P-099 うつ病のリワークプログラムで正しいのはどれか。

1. 集団療法として位置づけられる。
2. 精神科医療機関では実施されない。
3. 診断や就労状況などで対象者は限定されない。
4. 実施にあたり主治医との情報共有は制限される。
5. 急性期からプログラムに参加することが推奨される。

精神医学：神経症

43-097 厳粛な場所で「バカヤロー」と叫んでしまわな
いか、繰り返し気にしている患者の病態はどれか。

1. 広場恐怖
2. 社会恐怖
3. 解離性障害
4. 身体化障害
5. 強迫性障害

44-099 人前で発言することを恐れ、それを回避する場合に可能性が高いのはどれか。

1. 適応障害
2. 解離性障害
3. 強迫性障害
4. 社会恐怖症
5. 広場恐怖症

46-A-099 パニック発作に関して正しいのはどれか。

1. 健忘を残す。
2. 予期不安がある。
3. 転換症状である。
4. 脳波で棘徐波を認める。
5. フラッシュバックを伴う。

48-A-098 雑踏の中で強い不安が生じ、その場所を避けるようになるのはどれか。

1. 適応障害
2. 解離性障害
3. 強迫性障害
4. 広場恐怖症
5. 社交恐怖症

49-A-099 神経症性障害について正しいのはどれか。2つ選べ。

1. 全般性不安障害では疾病利得がみられる。
2. 強迫行為では不合理と思いつつも繰り返し手を洗う。
3. 離人症では自分がとても重い病気ではないかと心配する。
4. 社交恐怖では自分が見捨てられるのではないかと心配する。
5. 予期不安ではパニック発作がまた起きるのではないかと心配する。

50-A-099 強迫性障害について誤っているのはどれか。

1. 曝露反応妨害法が用いられる。
2. 強迫行為はさせられ体験による。
3. 対称性へのこだわりがみられる。
4. 不合理な観念が繰り返し浮かぶ。
5. 選択的セロトニン再取り込阻害薬が用いられる。

54-A-100 パニック障害の薬物療法で用いられるのはどれか。

1. 抗うつ薬
2. 抗精神病薬
3. 気分安定薬
4. 抗てんかん薬
5. 中枢神経刺激薬

精神医学：ストレス関連障害

43-098 外傷後ストレス障害(PTSD)の症状で誤っているのはどれか。

1. 思考途絶
2. 知覚過敏
3. 集中困難
4. 不安焦燥
5. 睡眠障害

47-P-098 PTSD(外傷後ストレス障害)について誤っているのはどれか。

1. アンヘドニアがみられる。
2. アルコール乱用の要因となる。
3. 小さな物音にも敏感に反応する。
4. 症状は外傷後1か月以内に改善する。
5. 原因となる出来事は、ほとんど誰にでも大きな苦悩を引き起こす。

49-P-099 PTSD(外傷後ストレス障害)について誤っているのはどれか。

1. 過覚醒がみられる。
2. アルコール乱用の要因となる。
3. 小さな物音にも敏感に反応する。
4. 症状は外傷後1か月以内に改善する。
5. 原因となる出来事は、ほとんど誰にでも大きな苦悩を引き起こす。

精神医学：摂食障害

46-A-100 摂食障害でみられないのはどれか。

1. 徐脈
2. 無月経
3. 低体温
4. 高血圧
5. 電解質異常

48-P-099 神経性無食欲症について正しいのはどれか。2つ選べ。

1. 骨密度は増加する。
2. 消化管の吸収不全がある。
3. 食物に対する関心は低下する。
4. 自ら誘発する嘔吐がみられる。
5. ボディイメージのゆがみがある。

52-A-099 神経性大食症について正しいのはどれか。

1. 女性より男性に多い。
2. 高カリウム血症がみられる。
3. 神経性無食欲症からの移行はない。
4. カロリーの低いものを過食することが多い。
5. 代償行動で最も多いのは自己誘発性嘔吐である。

53-P-098 神経性無食欲症について正しいのはどれか。

1. 頻脈になる。
2. 無月経になる。
3. 恥毛が脱落する。
4. 体温が上昇する。
5. 行動が不活発になる。

54-A-099 神経性無食欲症で正しいのはどれか。2つ選べ。

1. 骨密度は増加する。
2. 消化管の吸収不全がある。
3. 病識を持たないことが多い。
4. 食物に対する関心が低下する。
5. ボディイメージの歪みがある。

精神医学：パーソナリティ障害

48-A-099 見捨てられ不安を特徴とするのはどれか。

1. 演技性パーソナリティ障害
2. 境界性パーソナリティ障害
3. 強迫性パーソナリティ障害
4. 非社会性パーソナリティ障害
5. 統合失調質パーソナリティ障害

50-P-099 パーソナリティ障害と特徴の組合せで正しいのはどれか。

1. 依存性パーソナリティ障害—嗜癖
2. 演技性パーソナリティ障害——被暗示性
3. 回避性パーソナリティ障害—冷淡
4. 統合失調症質パーソナリティ障害——攻撃性
5. 非社会性パーソナリティ障害——几帳面

51-A-099 見捨てられ不安を特徴とするのはどれか。

1. 依存性パーソナリティ障害
2. 演技性パーソナリティ障害
3. 回避性パーソナリティ障害
4. 境界性パーソナリティ障害
5. 自己愛性パーソナリティ障害

52-P-098 境界性パーソナリティ障害にみられないのはどれか。

1. 不安定な感情
2. 孤立への欲求
3. 持続的な空虚感
4. 不明瞭な自己像
5. 繰り返す自傷行為

53-A-100 親しい人間関係を構築できず、奇異な考え方や風変わりな行動が継続してみられ、パーソナリティ障害を指摘された。

最も考えられるのはどれか。

1. 演技性パーソナリティ障害
2. 依存性パーソナリティ障害
3. 統合失調型パーソナリティ障害
4. 猜疑性〈妄想性〉パーソナリティ障害
5. シゾイド〈統合失調質〉パーソナリティ障害

54-P-100 成人のパーソナリティ障害への治療介入で正しいのはどれか。

1. 薬物療法は有効である。
2. 家族との連携を控える。
3. 早期に診断して患者に告知する。
4. 秩序を乱した行動に対して何も言わない。
5. 自傷行為などが頻回な場合は電気けいれん療法を行う。

精神医学：てんかん

45-P-099 てんかん発作にみられて、失神にみられないのはどれか。

1. 意識消失
2. 脳波異常
3. 前駆症状
4. 低血圧
5. 健忘

46-P-099 光刺激で発作が誘発されるのはどれか。

1. 欠神てんかん
2. 側頭葉てんかん
3. ミオクロニーてんかん
4. West (ウェスト) 症候群
5. Lennox-Gastaut (レノックス・ガストー) 症候群

47-P-099 学童期に発症することが多いのはどれか。

1. 欠神てんかん
2. 熱性けいれん
3. 側頭葉てんかん
4. West 症候群
5. Lennox-Gastaut 症候群

48-P-100 てんかんで知的障害を伴うのはどれか。

1. 側頭葉てんかん
2. Jackson てんかん
3. 小児欠神てんかん
4. 覚醒時大発作てんかん
5. Lennox-Gastaut 症候群

49-P-097 欠神発作について正しいのはどれか。

1. 知的障害を伴う。
2. チアノーゼを伴う。
3. 学童期の発症が多い。
4. 部分発作に分類される。
5. けいれんは一側上肢から全身に広がる。

50-A-100 12歳の女兒。寝不足の朝、突然に顔面や上肢にびくつきが生じて物を落とす。このときに意識消失はない。脳波で光過敏性を認める。考えられるのはどれか。

1. 覚醒時大発作てんかん
2. 若年性ミオクロニーてんかん
3. 小児欠神てんかん
4. 側頭葉てんかん
5. Lennox-Gastaut 症候群

51-A-098 笑いなどの強い情動で突然に筋緊張が低下し脱力する。このような症状がみられるのはどれか。

1. 欠神てんかん
2. 側頭葉てんかん
3. ナルコレプシー
4. 血管迷走神経失神
5. Jackson 型てんかん

52-P-089 てんかんについて正しいのはどれか。

1. 半数以上が遺伝性である。
2. 睡眠不足は発作の誘因である。
3. 年齢とともに発症率が減少する。
4. 成人では症候性よりも特発性が多い。
5. 発作の持続時間は後遺障害と関連しない。

52-P-099 てんかんについて正しいのはどれか。2つ選べ。

1. 単純部分発作は意識障害がみられる。
2. 欠神発作は過換気によって誘発される。
3. 特発性てんかんは脳の器質的病変が特定できる。
4. 複雑部分発作は側頭葉てんかんに多くみられる。
5. 全般発作は発作開始時にてんかん放電が大腦半球の片側にとどまっている。

53-A-096 高齢初発てんかんについて正しいのはどれか。

1. 突発性てんかんが多い。
2. 患者数は減少傾向にある。
3. 部分発作を呈することが多い。
4. てんかん重積状態に至ることはない。
5. 抗てんかん薬が無効であることが多い。

54-P-097 てんかんで正しいのはどれか。

1. 常にけいれんを伴う。
2. 発症率は30歳代が70歳代よりも高い。
3. West症候群の発症のピークは3~5歳である。
4. 高齢初発の症候性てんかんの原因疾患としては脳血管障害が最も多い。
5. てんかんによる突然死のリスクは、強直間代発作よりも欠神発作の方が高い。

精神医学：依存症

44-094 Korsakoff症候群の症状はどれか。2つ選べ

1. 作話
2. 解離
3. 語健忘
4. 失見当識
5. もうろう状態

44-095 アルコール依存症患者が急激に断酒したときに起こりやすいのはどれか。2つ選べ。

1. せん妄
2. 躁状態
3. 嫉妬妄想
4. けいれん発作
5. 被害関係妄想

45-A-098 アルコール離脱せん妄でみられるのはどれか。2つ選べ。

1. 作話
2. 幻覚
3. 振戦
4. 嫉妬妄想
5. 動眼神経麻痺

46-A-097 物質依存についての組合せで適切なのはどれか。

1. カフェイン———共依存
2. ベンゾジアゼピン———離脱症状
3. トルエン———嫉妬妄想
4. 大麻———身体依存
5. 覚せい剤———滞続言語

47-P-096 アルコール依存症で正しいのはどれか。

1. 女性に多い。
2. 病期の進行に伴い、以前よりも少量の飲酒で酔いが回る。
3. 振戦せん妄は飲酒中止後12時間以内にみられることが多い。
4. Wernicke脳症はアルコールの毒性が原因である。
5. 集団療法が有効である。

49-P-098 アルコールによる精神障害についてどれか。

1. 振戦せん妄は酩酊中に生じる。
2. Wernicke脳症はビタミンB12の欠乏による
3. 急性中毒は長期のアルコール摂取により生じる。
4. アルコール依存症の治療には集団療法が有効である。
5. アルコール摂取を続けると、少量の酒でも酔いやすくなる。

50-P-096 アルコール依存症に関連が少ないのはどれか。

1. ペラグラ脳症
2. Cotard症候群
3. Wernicke脳症
4. Liepmann現象
5. Korsakoff症候群

51-P-097 酔うまでの飲酒量が徐々に増加するのはどれか。

1. 渴望
2. 耐性
3. 身体依存
4. 飲酒中心性
5. 山型飲酒サイクル

52-A-098 アルコールの離脱症候群はどれか。2つ選べ。

1. 病的酩酊
2. けいれん発作
3. 複雑酩酊
4. 振戦せん妄
5. Wernicke脳症

54-A-097 アルコール離脱せん妄で正しいのはどれか。

1. 生命への危険性は低い。
2. 羽ばたき振戦がみられる。
3. 抗酒薬を速やかに投与する。
4. 飲酒停止後72~96時間に多くみられる。
5. アルコール血中濃度の上昇に伴って生じる。

精神医学：症状

43-091 せん妄をきたすのはどれか。

1. 解離性健忘
2. パニック発作
3. ナルコレプシー
4. アルコール離脱
5. 睡眠時遊行症(夢中遊行症)

44-091 突然子どもを亡くし、その悲しい思い出が頭を離れず、それ以外のことが考えられない状態はどれか。

1. 強迫観念
2. 虚無妄想
3. 思考干渉
4. 思考制止
5. 支配観念

45-A-096 わが国で生涯有病率が最も高いのはどれか。

1. うつ病
2. てんかん
3. 強迫性障害
4. 統合失調症
5. パニック障害

45-A-097 「細部に拘泥して重要なことを要領よく話すことができない」症状はどれか。

1. 保続
2. 迂遠
3. 思考制止
4. 思考途絶
5. 観念奔逸

46-A-098 「自分の周辺でただならぬ事件が起こっている気配がして不気味だ」という訴えはどれか。

1. 強迫観念
2. 社会恐怖
3. 妄想気分
4. 作為体験
5. 支配観念

46-P-096 いつも右足から踏み出さねばならないという思考の異常はどれか。

1. 保続
2. 迂遠
3. 作為体験
4. 思考化声
5. 強迫観念

48-A-079 葛藤が麻痺や失声などの神経症状となって現れるのはどれか。

1. 解離
2. 昇華
3. 心気
4. 転換
5. 抑圧

48-P-097 虫や小動物の幻視が特徴的なのはどれか。

1. てんかん
2. 振戦せん妄
3. 統合失調症
4. Huntington 病
5. ナルコレプシー

50-P-097 自我の障害はどれか。

1. アンヘドニア
2. 観念奔逸
3. 妄想気分
4. 離人症
5. 連合弛緩

50-P-098 家族がすぐにでも病気になるのではないかと、という心配を繰り返し訴えるのはどれか。

1. 解離性障害
2. 強迫性障害
3. 社交(社会)不安障害
4. 全般性不安障害
5. 広場恐怖

51-P-098 回避がみられるのはどれか。

1. 心気障害
2. 身体化障害
3. 強迫性障害
4. 全般性不安障害
5. PTSD(外傷後ストレス障害)

53-A-099 「自分がやっていることなのに、自分がやっている感じがしない」と訴える患者の症状はどれか。

1. 恐怖症
2. 拒絶症
3. 離人症状
4. 心気症状
5. 感情鈍麻

53-P-097 驚きなどの情動によって脱力発作が誘発されるのはどれか。

1. 睡眠時驚愕症
2. ナルコレプシー
3. むずむず脚症候群
4. レム睡眠行動障害
5. 睡眠時無呼吸症候群

54-A-098 夢に関連する睡眠障害がみられるのはどれか。

1. 睡眠時驚愕症
2. 睡眠時遊行症
3. レム睡眠行動障害
4. 睡眠関連摂食障害
5. 周期性四肢運動障害

精神医学：小児精神疾患

44-100 小児自閉症でみられるのはどれか。

1. ごっこ遊びをする。
2. 人見知りをしなない。
3. 新しい環境を好む。
4. おとぎ話を聞きたがる。
5. 身振りで意思を伝える。

45-A-099 小児の精神障害で正しいのはどれか。

1. 吃音は強迫性障害に分類される。
2. ネグレクトによって反応性愛着障害が起こる。
3. 児童期に妄想型統合失調症が発症することはない。
4. 選択性緘黙は脳の器質的病変を原因とすることが多い。
5. 一過性チック障害の約半数が Tourette 障害に進行する。

46-A-081 「全般的な知能に大きな低下がなく、文字を読めば分かるが書くことができない」のはどれか。

1. 学習障害
2. Rett 症候群
3. Tourette 症候群
4. 広汎性発達障害
5. 注意欠陥多動性障害

47-A-099 小児の精神障害で正しいのはどれか。

1. 吃音は行為障害に分類される。
2. 児童期に恐怖症を発症することはない。
3. 虐待を原因として反応性愛着障害が起こる。
4. 小児自閉症は約半数が統合失調症に移行する。
5. 選択性緘黙は脳の器質的病変を原因とすることが多い。

47-P-091 広汎性発達障害で認めにくいのはどれか。

1. 姿勢異常
2. 精神遅滞
3. 限局した反復行動
4. コミュニケーション障害
5. 相互的な社会的関係の異常

49-A-100 小学2年生の女兒。学校では一言も話さない。うなずきなどのジェスチャーでコミュニケーションは可能。自宅では普通に会話ができる。考えられるのはどれか。

1. 読字障害
2. 選択性緘黙
3. Rett 症候群
4. 広汎性発達障害
5. Tourette 症候群

50-P-100 小児の精神障害で正しいのはどれか。

1. 吃音は女兒に多い。
2. 分離不安障害は学童期に多い。
3. 反応性愛着障害は過度に警戒的である。
4. 反抗挑戦性障害の症状は家庭内に限局する。
5. 注意欠陥/多動性障害では成長につれて多動よりも不注意が軽快しやすい。

51-A-100 全般的な知能に大きな低下はなく、文字を読めば分かるが書くことができない。このような症状がみられるのはどれか。

1. 学習障害
2. 行為障害
3. 広汎性発達障害
4. Tourette 症候群
5. 注意欠如・多動性障害

52-A-097 小児自閉症について正しいのはどれか。

1. 学童期に発症する。
2. 脊椎変形を生じる。
3. 女兒より男児に多く出現する。
4. 精神遅滞を伴うことは稀である。
5. 大部分の症例でてんかんを認める。

53-P-096 注意欠如・多動性障害について正しいのはどれか。2つ選べ。

1. 薬物療法は行わない。
2. 男児よりも女兒に多い。
3. 生育歴の聴取が重要である。
4. 二次性の精神症状に注意が必要である。
5. 成人期において診断されることはない。

精神医学：精神病薬

43-092 幻覚妄想症状に最も関係があると考えられている神経伝達物質はどれか。

1. アセチルコリン
2. グルタミン酸
3. セロトニン
4. ドーパミン
5. ノルアドレナリン

44-092 抗精神病薬の副作用で治療しても遷延する可能性が高いのはどれか。

1. 突進歩行
2. アカシジア
3. 悪性症候群
4. 全身倦怠感
5. 遅発性ジストニア

45-P-100 薬剤とその典型的副作用との組合せで正しいのはどれか。

1. 抗うつ薬——不安発作
2. 抗不安薬——脱力
3. 抗精神病薬——幻覚
4. 抗てんかん薬——錐体外路症状
5. Parkinson 病治療薬——無月経

47-A-100 悪性症候群の原因となる可能性が最も高いのはどれか。

1. 抗うつ薬
2. 抗不安薬
3. 気分安定薬
4. 抗精神病薬
5. 抗てんかん薬

48-A-100 抗精神病薬を服用中の統合失調症患者。意識障害、37.5℃以上の発熱、発汗および身体のこわばりが出現した。最も考えられるのはどれか。

1. アカシジア
2. 悪性症候群
3. 急性ジストニア
4. 遅発性ジスキネジア
5. 薬剤性 Parkinson 症候群

51-P-100 悪性症候群の症状はどれか。

1. 筋弛緩
2. 高血糖
3. 高熱
4. 徐脈
5. 白血球減少

53-A-098 ベンゾジアゼピン系睡眠薬の依存について正しいのはどれか。

1. 中高年者にはみられない。
2. 身体依存は形成されない。
3. 離脱症状としてせん妄がある。
4. 常用量であれば依存は形成されない。
5. 作用時間の長い薬剤の方が依存を形成しやすい。